

Q. D. B. V.  
DISPUTATIO MEDICA  
*De*  
OEDEMATIS  
NATURA & CURA,  
Qvam  
Gratiiss. Facultate Medica  
Indulgente  
Pro

L O C O  
In Eâdem suô tempore ob-  
tinendò

Ad diem 5. Jun. A. C. M. DC. LXXXV.  
Publicè ventilandam sistit

JOH. GUILIELMUS PAULI  
Lips. Phil. & Med.. Doct.

*RESPONDENTE*

CAROLO FRIDERICO LUTHERO,  
Vrat. Sileſ.

H. L. Q. C.

---

LIPSIÆ.  
Literis JOHANNIS GEORGII.

RPJCB

B. C. D.

## PRÆLOQVIUM.



Vi Humorum in Corpore nostrō vivente absolvitur Circulus , obeundis ritē partium solidarum actionibus adeo reqviritur necessaries , ut statim ac ille qvocunqve turbatur modō , varia in his laſionum exſurgant genera . Qvotidiē hoc in morbis obſervare eſt internis non minūs ac externis , ceu in qvorum plerisqve Humorum Motus aut primariō , aut ſecundariō ad minimum , exiſtit vitiatus . Sic etiamsi v. g. Catarrhi ab irritante qvôdam proximè inferantur , ſubsequentis nihilo minūs fibrillarum crispaturæ occaſione mox ab impedito lymphæ concomitantur motu . Sed qvō vi- tium tale magis , primarium in medium afferatur , exempli loco ē Tumorū nonnullis ( Humoralibus qvoqve propterea appellatis , qvod eosdem humor qvidam stagnans , i. e. in motu ſuō impeditus , tanquam Causa Materialis proxima conſtituat ) unicūm denomināſſe Oedema ſufficiat , Disputatione præſen- ti ſub dupli capite pluribus ita ventilandum , ut in primō Theoreticō Natura , in alterō verō Practicō ejusdem Cura cuivis pateſcat .

Faxit DEUS Opt. Max. Fe-  
liciter !

A 2

Ca-

# Caput I. THEORETICUM.

§. 1.

**Q** Vanquam *Oedema* suæ intuitu originis, quam Græcia <sup>a mō</sup> *τέ τιδῶν*, i. e. tumere seu inflari debet, Tumorem quemvis in genere morbosum Hippocrati significet, temporis nihilominus successu apud Medicos obtinuit & adhuc obtinet usus, ut speciale magis ac partiale in corpore nostro Extuberantiam præternaturalem exprimat sequenti circumscriptam definitione : *Tumor* est *Humoralis*, *albicans*, *mollis*, *digitis* g, ita cedens ut horum vestigia retineat aliquādiu impressa, calore nullo, nec dolore, aut saltem paulisper tensivō, moleſtus, in cuncte alicubi ac partibus subcutaneis & crassioribus feri moleculis intraporos istarum nimium coacervatis excitatus.

§. 2.

Generis hic proximi locum *Humoralis* sibi vindicat *Tumor*, eò, quod cœdematosa extuberatio talem in parte quādam corporis auctam designet magnitudinem, ad cuius post partum productionem *Humor* proximè facit, non *Flatus*, nec *solidioris* alicujus partis in alteram Decubitus, nec *Res* etiam quādam totō genere præternaturam, aliis alias tumorum speciebus progenerandis, v. g. *Tympaniti*, *Herniis* variis, diversis *Luxationibus*, it. tumoribus calculosis, pilosis, verminosis &c. inservientes, à quibus *Oedema* tamen per datum oppidò discrepat genus, veluti solummodò Extumescientiis, quas humor pariter quidam procreat, commune, e. g. *Inflammationi*, *Erysipeli*, *Scirro* &c.

§. 3.

Specificam verò *Differentiam* Oedemati, quā ab humoralibus etiam istis discernatur tumoribus, conciliant : primò *Qualitates* quatuor in cœdemate sensibiles, instar propriatum ipsi *essentialium* se habentes; deinde *Subjectum*, ac *Causa* denig, *Continens*; quæ singula quidem nunc eodem quoque ordine essent enucleanda, sed cum scrutinium *essentialium* cœdemati adjunctorum, subjecti ejusdem ac causæ supponat præcognitionem, ab horum potius perlustratione initium licebit desumere.

§. 4.

## §. 4.

*Subiectum* equidem Oedematis in genere spectatum occurrit duplex: *inbasitoni* alterum, alterum *radicationis*; quorum tamen illud solum, quia adaequatum, in definitione expressum, hoc vero in §. 9. etiam denominandum. *Inbasitoni* scilicet *subiectum*, seu pars in cedemate affecta adequa ta, *Cutis* partesq; existunt subcutaneae: ita quidem, ut in Cute tertiam cum primis ejus laminam, prater omnis generis vascula ex tendineis fibris glandulisque interspersis contextam, ac recentissime a Bidloo *Anatom. Corpor. Human.* Tab. 4. per opticum instrumentum nitide depictam, affici statuam, e subcutaneis vero partibus, pinguedinem musculosque, tam subcutaneos, quam alios κατ' έξοχην sic dictos cum membranis suis pati eò lubentius existimem, quod Excell. Dn. Meibomium Helmstädti in Dissertatione quadam de *Tumoribus pedum sub Umbone Ejus A. 79.* habitâ, sectionis ope deprehendisse videam, humorem in pedibus cedematosum non sub cute tantum, sed & sub membrana muscularum, & in ipsis quoque musculis, solito laxioribus, habere sedem.

## §. 5.

Sed dubium exemplo huc se se fuisse, annon internæ quoque corporis partes ab cedemato lo intordum affigantur tumore? & ut verum fatear, non adeò aberrare videtur *Fabricius ab Aquapendente* in partibus internis ac externis cedemata oriri *Oper. Chirurg. p.m. 32.* scribens: etenim quamvis rariores huc, si ullæ, Autorum cedemata interna enarrantium prostent observationes, probè tamen si consideretur, constitutionem scirrhosam, quæ interna saepius vexat viscera, & quæ à sero ac cedema, magis saltē coagulatō proficiunt, vix absonum erit suspicari fortassis cedematasam internè aliquandò priùs subesse habitudinem, quam perfectus ibi gignatur scirrus: nihilominus cum interna talia cedemata omnem Medici eludant explorationem, in tradendo cedematis subiecto ad externum malui respicere tanquam tale, de quô Medicis & Chirurgi unicè ferè solent disquirere. Interim si quod subiectum cedemati utrique communem à me veniret exhibendum, illud commode per fibrosas simpliciter & glandulosas partes ubivis describerem obvias.

§. 6.

De cætero cutim ac partes subcutaneas magis, quam alias partes esse commodas, ut ab œdematoſo occupentur tumore, p̄ter Autopsiam modò §. 4. confirmatam, ipsa eautundem apta conformatio aptusque satis perſuadens ſitus: Cum enim hujus reſpetu incubentis Atmosphæra attacui quandoque satis injurioso maximè ſint expositæ, ratione autem illius à minoribus longè irrigentur arteriolis, quām quarum interdum pulsus lymphæ ad vascula ſua crystallina urgenda ac protrudenda ſufficiat, utroque ſanè modò facilius h̄ic, quam alibi lymphæ refluxui objici remoram & per conſequens œdema introduci eluſecit.

§. 7.

Quinimò ex conſideratō partium ſitu clatum quoque evadit, cur pedibus p̄t partibus aliis œdemati frequentius ſint obnoxii, adeò, ut nonnulli ſtatiū ac erectam corporis poſitaram plus debitō continuant noctis que p̄fertim tempore ſedentes ſomnum capiunt, pedum ejusmodi incurrant tumores. Suppoſito enim, ceu veriſiſime à Borello de Mot. Animal. Part. 2. Cap. 5. monſtratō, magna Cordis muſculofaci pro ſangvinis pulſu requiri virtutem ad eam, que in vasis jam dum propter ſungvinem ibi exiſtentem deprehenditur, exſuperandam reniſtentiam. Quod ſi itaque quaunque ex cauſâ hanc cordis quodammodo vim contingat immuni, prout ſomni etiam tempore accidit, ratione duplicitis effectus, qui ſangvinis quoad motum in verticali corporis ſitu ſequi ferè debet, dum primò quidem ſangvis arteriosus propriō haud diſſicuſter pondere inferiora versus ruit, dein tamē venosus propter eandem gravitatem diſſicilius longè ascenſit, perquam promta ſeri cratiſſoris intra pedum poros habebitur colectio, i. e. tumor formaliter œdematoſus.

§. 8.

In eō quippe conſiſtit ratio, quā ſubjectum œdematis in genere afficitur, ut pori ejus ſive interſtitia, vel fibras inter, vel glandulas relicta, à continentे plus debitō diſtendantur cauſa, unde ad proportionem, quā hæc ibi coacervatur, tumor ipſe œdematoſus vel major evadit, vel minor. Minus proin neceſſe eſt, ut in omni ſemper Oedemate Cutis æque ac omnes partes subcutaneæ ſimul patian-

patiantur, cum sola nonnunquam cutis, ubi Oedema non adeo profandum affigit, nec nimis diffusum, videatur sufficere. Nec frustra in definitione pars affecta particulâ alicubi fuit limitata, quia sicutis secundum totam, aut saltem maximam sui péripheriam in mollem ejusmodi elevetur extuberantiam non Oedema amplius, sed Leucophlegmatia potius salutatur Practicis.

S. 9.

*Radicationis* autem *subjectum*, seu ea affecta pars, in qua antecedens Oedematis causa velut delitescit sopita ipsa videtur *Massa sangvinica*, unicus ille in corpore nostrō Hamor universalis, qui à cordis impulsu ad omnes corporis viventis partes tam internas quam externas, continuò vibratus hisce illaudabiles pariter, si adfint, ac laudabiles simul adportat particulas, in tumore nostrō ita constitutus, ut serosæ ejus massulæ vel plus justò abundant, vel præternaturali etiam plus minus viscidâ gaudeant crassitie, è causis quemadmodum mox evolvendis uberioris constabit.

S. 10

In definitione siquidem *proxima & continens causa crassiores seri* subinnuntur *moleculæ* intra partis affectæ poros nimium co-cervatæ, sive crassities ejusmodi his naturalis magis fuerit, sive præternaturalis. Est videlicet serum altera integralis *Massæ Sangvineæ* pars, in quam & cruorem hæc sibi relicta sponte sua, vel in tubulis vitreis setâ haud crassioribus annotante *Antonij de Heide Anatom.* *Mytul. p. 175.* facescit, ratione texturæ sua ex particulis magnitudine ac figurâ differentibus, sensibiliter sub aquâ & gelatina comprehensis, conflata. Candelæ enim ardoris flammæ in cochleari expositum serum aqueam exhalare portionem, gelatinosam verò servare restituentem, notissimum. Jam uti seri crassitiem naturalem eam dico, quam particulis suis gelatinosis bene se habentibus, decentique sub proportione aqueæ parti combinatis, refert acceptam; ita ex opposito præternaturali ejus crassitiem voco istam, quam à particulis chyli crudioribus plus minus pituitosis ac viscidis, digestionis prima culpa enatis, adipiscitur. Quibuscumque itaque ex crassioribus his seri moleculis, sive naturalibus sive præternaturalibus, in partium externalium poris stagnare ac modò successivè, modò repente coacervari ibi datum est, continens tumoris cedematosi

matosi eo ipso evadunt causa, quod nimium coacervata totam loci affecti dimensionem reddant auctiorem.

§. 11.

Cognita hucusq; continentे oedematis causā, serum idem in vasis adhuc fluctuans cause antecedentis habebit rationem tantò magis, quantò vel copia ejus adest major, vel consistentia crassior. Sicut namque alias ea seri ad cruentum in corpore nostro est proportio, ut hujus quantitas decies ad n. inimum ab illō. Excell. nostrō D. D. Bobnio Act. Erud. Lips. A. 1682. p. 127. accuratè ostendente, excedatur; ita si pondus hoc, respectu vel ad rubicundam sanguinis partem, vel totum etiam corpus habito, notabilē sui capiat incrementum, serum tunc gelatinæ sua simul auctæ intuitu efformando cedemati admodum redditur dispositum. Nihilominus præter hanc seri quantitatē, & consistentiam ejus præternaturaliter crassorem cedemati producendo sufficere, Cache&tici pituitosi, Senes ac Mulieres, suo quotidie testantur exemplo, utpote qui fere ratione crassioris seri frequentius quam alii, tumoribus ejusmodi deprehendunt succumbere.

§. 12.

Cause autem Procatartica omnes, moventes serum, quod continens Oedematis exsurgat causa, in genere quidem seri adjuvant stagnationem, attamen in specie earum alia in vasa magis, alia in locum affectum, alia denique immediate in serum ipsum suas exerunt operationes. Primum in vasa, serum à partibus revahentia, tām venosa quam lymphatica operantur cuncta, quæ ab extra ista comprimunt, comprimendoque efficiunt, ut serum vel ultrà pergere impotens vel vasa quoque lymphatica distimpens, in poris copiose detineatur partium, v. g. Uterus ingravidatus tali vasorum compressione ultimis gestationis mensibus cedematosos in gravidis inferens pēdes. Huc itidem spectare videntur luxationes &c. cedematosis interdum extuberantiis, Autore Rich. Jo. Wissman in the severall Chirurgicall Treatises p. 81. pariter autam supeditantes.

§. 13.

Deinde in locum hic affectum Causæ occasionales agunt ex, quæ vel fibras ejus stringere, vel laxare valent: priori enim modō serum partis interstitiis velut infigitur, posteriori vero fibre partculis

culis serosis ad yascula sua propellendis redduntur ineptæ. Illud contingit maximè in doloribus, v.g. podagre dictæ vulgo frigidæ, it. vulnerum &c. hoc autem in Inflammationibus, Contusionibus &c. quando his cœdemata nonnunquam succedunt, evenire videtur, quinimò à tali fibrarum laxitate petenda ratio, cur eadem loca, quæ semel cœdema fuerunt passa, levi data occasione denuò ab hòc affligantur.

§. 14.

Tandem immediate afficiunt serum occasionses, quæcunque hujs vel abundantia, vel crassitie præbent ansam, sive sex rerum nonnaturalium, sive præternaturalium accensendæ veniant classi. Sic rebus nonnaturalibus admunerantur: primò Aer humidior & frigidior, quorum ille seri non saltem quodammodo adauget copiam, sed & consistentiam ejus magis inspissat unà cum frigidiori habitum quoque corporis multum vellicante. Hinc Alimenta solida æquæ ac fluida, vel in nimiâ assumpta copiâ, vel crassiora etiam, viscosa & acida &c. deglutita. Tùm Quietis ac Somni excessus, humorum retardando circulum, crassitatem sero præternaturalem inducens. Porro Excretæ & Retenta, v.g. Urinæ in renibus secretio imminuta, it. in mulieribus menstrua suppressa. Ex Animi denique Affectibus Tristitia imprimis, Timor ac Terror &c. qui singuli fingenendò spiritus humores in motu magis lentoſ & in crasi plus minùs crassos efficiunt.

§. 15.

Inter res autem præternaturales agmen quasi dicit depravata alimentorum in Ventriculo digestio talis, qua ad pituitosam, vel acidam quoq; dictam vergit cruditatem, Cacochymiz pituitosæ, à quâ Cachexia similis hic pariter consideranda, mater genuina Hinc Phthisis diuturnior adeſt, pulmonum exulceratorum occasione variis heterogeneitatibus inquinans serum. Febres demù tam acutæ, quam chronicæ se offerunt, crassi Mæſe ſæ ita turbantes, ut curas easdem cœdematosi nonnunquam crurum sequantur tumores, idq; èd facilius, quò liberius ægri convalescentes ſuo denuò indulgent genio &c.

§. 16.

Perlustratis ita hactenus ſubiecto cœdematis atque cauſis, ad

B

qua-

quatuor adjuncta ipsi essentialia, cognitununc faciliora, reverti licet : horum primum albicans est color a sero ipsò crassior in tertia cutis laminâ contento, partim ratione proprii coloris, partim & ratione impediti sanguinis versus corpus cutis reticulare influxus, conciliatus. Alterum mollieres determinata cernitur, talis videlicet, quæ digitis & cedit, & horum vestigia aliquamdiu ostendit impressa, antequam ad pristinum redeat seu resiliat statum, à crassioribus pariter seri exorta particulis debiliore instrucis elatere, quam ut è momento quasi priorem reassumere queant locum. Tertium caloris (sub intellige p.n. potius quam naturalis, licet & hic imminutus sit) habetur absentia ex eō, quod partium in oedemate sensibilis de sit irritatio, spirituum ac sanguinis uberiorem ad partem affluxum, à quô in Inflammatione aliás & Erysipelate p.n. dependet calor, determinans. Quartò denique dolor observatur nullus ob eandem irritationem absente, in vellicatione quippe potius, quam in solutione continui, consistere doloris essentiam sufficienter demonstrat Borellus de Motu Animal. Part. 2. Cap. 18. Aut si exilis nonnunquam combinetur dolor, tensivus saltē is est à sero poros replete ac fibras non nisi pondere vellicante enatus.

§ 17.

Differentiæ Oedematis pauciores considerari merentur : Primo ratione magnitudinis, quā oedema in loco affectione se exten dit, aliud circumscriptum est, quod minus occupat spatiū ; aliud diffusum, quod per majus sub tumoris oedematosi diffunditur nomine. Hinc originis intuitu, Oedema vel primarium existit, vel secundarium : quorum illud alium non æque morbum sequitur, ac hoc, quod ab aliō dependet, v.g. Phthisi, Hydrope &c. Tum respectu temporis, Oedema recens aliud, aliud inveteratum occurrit. His dēmū Autorum nonnulli v. g. Barbette Chirurg. p. m. 99. aliud discrimen addunt à qualitate causæ petitum, quō Oedema aut perfectum, aut imperfectum, & hoc rursus vel phlegmonodes, vel erysipelodes, vel scirrhodes esse, pronunciant : verum cū cedema ipsis imperfectum dictum sub definitione verā haud comprehendatur, differentia ista negligenda potius esse videtur, quam pluribus enodanda.

§ 18.

§. 18.

In Signorum Diagnosticorum censum venientibus ipsis sensibilibus cedematis qualitatibus §. 16. evolutis, non est, cur ad Prognosin pergere cessem. Ratione eventus : Oedema aliud periculosum est, aliud periculò vacat : periculosum est, quod à periculoso dependet morbo, v. g. hydrope, phthisi &c. periculò autem vacat id, quod primarium est, aut saltem secundarium tale, morbum quod minus periculosum insequitur, v. g. Luxationes, vulnera &c. In genere alias cedema recens facilius sui admittit Curationem, quam in veteratum, cùm eandem sapientius penitus eludens. Ratione temporis : Oedema diu satis, tanquam morbus chronicus, perdurare solet, ita ut, si minus resolvatur, Guillemeau aux Oevres de Chirurgie p. 535. quinquaginta definiat dies, antequam suppuretur, Ratio ne quippe modi eventus, hic, modò cedema sit legitimum, per resolutionem semper contingere observatur : ubi verò in imperfectum forsitan degeneret, v. g. phlegmonodes, vix nisi per suppurationem terminatur. Si deniq; durum ac dolorosum evadat cedema mctum subesse, ne in Scirrum transmigret, indicat VVifeman loc. cit.

Q. in

Caput II.  
PRACTICUM.

§. 1.

IN Oedematis Curatione circumspiciendum ante omnia, an primarium hoc fuerit, an secundarium ; secundarium enim si affigit, omnis in ejus remotione conatus, nisi & ipse morbus primarius removeatur, erit frustraneus. Pro primariò autem feliciter extirpando triplici Indicationi in genero, Curatoria scilicet, Præservatoria ac Vitali venit satisfaciendum. In Curatoriâ, qua causam continentem respicit, adeoque circa tumorem ipsum auferendum versatur, crassiores seri particulas in partis affectæ poriscoacervatas esse tollendas, præcipitur.

§. 2.

Duplex autem deprehenditur via, quâ ejusmodi amotio suffici potest, ordinaria alia, alia extraordinaria. Per viam ordinariam

riam serum stagnans removetur admoyendō ea, quæ decentem ipsi, quò vasa denuò sua, revehentia subintrare suumque ibi circumlum repetere possit, conciliant fluxibilitatem. Diaphoreticā præter interna mox §. 8. de prōmenda, præstant hoc imprimis Topica extrinsecus tumori applicita, talia videlicet, quæ ratione substantia faliñæ plus minùs acris, quā pollut, dum stagnantes seri moleculas crassiores comminuant, comminuendōque veluti resolvunt, Discutientia plerumque audiunt.

§. 3.

Discutientia ejusmodi Pharmacia suggestit varia sub consistentiâ vel humidâ, vel siccâ, vel mediâ denique, in usum trahenda. Humida quæ adhibentur sunt primò variorum Simplicium, e. g. Rad. Bryon. Helen. Herb. Absinth. Rorismar. Puleg. Origan. Hyssop. Lupul. Fl. Chamamill. Hyper. Bacc. Laur. Juniper. &c. aut cum ∇ simpl. aut c. vino parata Decocta, calidè loco affecto, vel lotionis, vel fomenti vice, prout comodum magis videbitur, applicanda. Hinc olea habentur & Balsama, v. g. oleum laurin. cer. mastichin. &c. Balsam. Peruvian. it. Balsam. ♀ tam vulgaris, quam ♂, à Collectaneis Chymicis Leidenibus c. 31. descriptum. Omnibus tamen hisce paria tandem, si non superiora, ex fluidis observantur lixivia cum calce vivâ, Θε ♀, it. cineribus viis, quercus, fagi &c. ad imitationem Plateri Prax. tom. 3. p. 297. confecta, aliquali Sp. V. additione magis nobilitanda.

§. 4.

Sicca verò sub fomentorum siccorum titulo in auxilium vocantur tam. Vegetabilia, modò §. 3. recensita, quam animalium quorundam stercore, e. g. bovin. ovill. columb. &c. ita quidem, ut vel immediatè admoveantur cuti, vel sacculo priùs inclusa. Fatendum tamen operationes ejusmodi siccorum medicaminum, convenienti quia fluido, cum quo magis penetrare queant, destituuntur, vix adeò notabiles esse posse, nisi sacci forsitan eum saltē in finem usurpentur, ut calidi emplastris v. g. superimpositi horum caloris ratione promoveant activitatem.

§. 5.

Convenientius proin eadem ingredientia l. a. in Cataplasmatis rediguntur consistentiam; Cataplasmatenim sunt & Emplastra, quæ

qua mediā demūd humida inter & siccā fruuntur texturā. Ex  
Emplastis autem proficia sunt: Emplast. Oxycroc. Dia<sup>¶</sup>. Dia-  
phoret. Minsicht. ad Hydrop. August de Galban. Crocat. Minf. &c.  
oleo præsertim si quodam v. g. ♀. lign. quajac. laurin. &c. antea fue-  
rint malaxata. Ordinariò equidem Discutientia hucusque descri-  
pta in principio ac incremento oedematis cum Repellentibus dictis  
jubentur jungi, verū, cùm sola Discutientia illo quoque tempore  
proposito exactè respondeant scopo, Repellentia penitus omittere  
placuit. Interim quò Topica ipsa extēna operentur citius, non in-  
consultum erit convenientes ipsis, si affecta ferat pars, desuper appli-  
care Deligationes, & comprimendo, & calorem partis intendendo  
adèo præstantes, ut *VViseman in the severall Chirurgicall Treatises.*  
p. 83; absq[ue] his nil magni momenti in tumorum pituitosorum cura-  
tione posse perfici pronunciet proptereaque tibialia, manicas, &  
Chirothecas, qua de die in diem stringantur firmius, commendet.

### §. 6.

Sed per extraordinariam magis viam serum educitur tunc,  
quando medicamina modò lustrata & adhibita faustus effectus ex-  
cipit nullus: tum enim è Chirurgia Scarificationes in subsidium  
ducendæ exque, cùm serum educendum crassius, ~~κατὰ συρπὸν~~ po-  
tiū seu per træcum & cæsim, quam ~~κατὰ πληγὴν~~ si verberatim &  
punctim, instituenda, attendendo unā, an Oedema superficiale ma-  
gis fuerit, an profundum, quò incisuræ pariter vel superficialiter, vel  
profundè infligantur cuti.

### §. 7.

In Præservatorià porrò Indicatione, qua circa Antecedentem  
causam occupata est, & mox unācum Curatoriā hic consulenda, Se-  
rum vel abundans imminuendum, vel crassius incidendum atque  
eliminandū esse, Ventriculi it. digestioni plus minus læsæ succur-  
rendum, ostenditur. Ut itaque seri, si adsit, tollatur copia, Evacu-  
antia universalia, speciatim Cathartica, Diaphoretica & Diuretica  
conducunt. Ex Catharticis inferviunt ea, qua Phlegmagoga &  
Hydragoga vulgo nuncupantur: nempe è Vegetabilibus Rad. Ja-  
lapp. Bryon. Herb. Soldanell. Asar. Pulp. Colocynth. Sem. Cartham.  
Agaricus, Gumm. \*c. de Peru &c. Ex Mineralibus verò & dulcis  
præstò est, it. Pilul. Jares à Dn. Boyle of the Usefulness of natural

*philosophy Tom. 2. p. 110. ad eò laudata & p. 308. descripta : quibus  
§. vit. quoque poterit addi. c. dupl. vel tripl. ① i prius fixatus ad  
eum modum, quem Carol. de Maetz in *Prodrom. Chym. Ration.*  
p. 28. edocet.*

§. 8.

Diaphoretica verò inter ea feligenda veniunt, quæ naturæ sunt  
Θinæ volat. simplicia non minùs, quam præparata, v.g. Rad. An-  
gel. Chin. Card. bened. Helen. Sarsapar. Levist. Herb. Fumar. Salv.  
Rut. Card. bened. Origan. Rorismat. Thym. Lign. Sassafr. Junip. Gu-  
jac. &c. Sp. Θ & c. simpl. & aromatisatus, e.g. anisat. caryophyll. &c.  
it. Sp. & Θ vol. C.C. sangvin. hum. &c. quæ singula serum crassius & q̄  
incidento ac abundans per diaphoresin ejicendo non absque suc-  
cessu operantur.

§. 9.

Quinimò pleraque ex hisce diaphoreticis, si neglecta sudoris  
curâ usurpantur, egregiâ serum abundans per urinam evacuandi  
pollent virtute; quibus nihilominus diureticum in scopum adjici  
adhuc poterunt ea omnia, quæ aliás in Hydrope diuresin ciere lau-  
dantur: v.g. ex Simplicibus Rad. Bardan. Rust. Foenicul. Asparag.  
Gramin. Herb. Foenicul. Ap. Aneth. Petroselin. Bacc. Juniper. Fru-  
itus Alkekeng. Sem. Dauc. &c. ex præparatis verò Spiritus aperitiv.  
Penot. Sp. Θ & ① præsertim Sp. V. ritè dulcificati, it. Sp. mileped.  
Θ volat. succin. Θ genist. stolid. fabar. &c.

§. 10.

An V. Sonem autem Evacuantibus recentis semper præmitte-  
re sit consultum, jure meritòque hæreo. *Thevenin* equidem des Tu-  
meurs p.m. 250. magnum sangvinis missioni etiam repetita in nostrò  
affectu attribuit effectum; ast, cum rationes ejus tanti haud videan-  
tur momenti, quæ indifferentem V. Sonis hic usum nobis, infrigidi-  
ori præprimis climate viventibus, valeant persuadere, vereor ne Au-  
tor sibi, tanquam Chirurgo, magis forsan, quam agroto genero-  
so tali consulat remedio. Quod enim aliquā sangvinis parte de-  
tracta calorem naturalem facilius per vasa distribui diicitat, vix nisi  
plethora præsente hæbet locum, adeoque & V. Sonem tunc saltem,  
quando Plethora juncta maximè urget, instituere convenit.

§. 11

## §. 11.

Hinc quod serum crassius comminuat, partim  $\ominus$  sa, v. g.  
 $\Theta$ \*c.  $\ddot{\Theta}$ . Plat. Crystall.  $\ddot{\Theta}$ . Arcan. dupl. it. liquor terra fol.  $\ddot{\Theta}$  &c.  
partim  $\ominus$  ino.  $\ddot{\Theta}$  ea, e.g. Rad Ari. Gentian. Imperat. Herb. Menth.  
Cinam. Caryophyll. Zingib. Piper. Effen. absinth. centaur. min. &c.  
it. Tinct.  $\ddot{\Theta}$ . simpl. & composit. &c. sive sola, sive invicem commissa  
usurpentur, multum præbent præsidii. Salsa quippe remedia, præ-  
terquam quod pituitosas in primis viis cruditates serumque in Mâ  
Mâ crassius attenuent, & hoc commodi præstant, ut comminutas una  
Mâ Sæ. particulas easque intiles ac è corpore prescribendas per di-  
uresin blandè eliminent. Salinosulphurea vero præter eundem  
communitionis effectum, Ventriculi quoque digestioni plus minus  
læsa optimè simul prospiciunt, eamque si ad pituitosam vergat crû-  
ditatem corrigunt.

## §. 12.

Etenim si acida Ventriculi nonnunquam combinetur cruditas,  
à qua seri eatenus dependere potest crassities, quatenus chylus sapo-  
re simili plus minus infectus ubi commiscetur sero, hoc in coagulum  
facillimè modò eodem cogit, ac spiritum v. g.  $\Theta$  is talem in extra va-  
satò sero edere effectum observamus : tunc eorum medicaminum,  
quæ acidum corrigunt, expetendum auxilium, sive hac terrea sint  
acidum in primis viis absorbentia, v. g. ocul. 69. lap. percar. man-  
dib. luc. pis. C. C. corall. &c. sive  $\ominus$  ia alcalia acidù texturam inver-  
tentia, tam fixa, uti  $\ominus$  absinth. centaur. min.  $\ddot{\Theta}$ . &c. quam volatilia,  
e.g. Spirit. lumbri. terestr. per putrefactionem paratus. &c.

## §. 13.

Sola Indicatio Vitalis breviter adhuc superest consideranda,  
ad vitium conservationem Dieta tali, qua antecedenti causa nul-  
lum accrescit incrementum, collimans : in hac proin prescribenda  
eo minus exigitur laboris, quod magis nocivus sex rerum nonnatura-  
lium usus è Cap. i. §. 14. jamdum patuit. Quo intuitu Aer calidus  
seligatur & siccus ; Alimenta parciori capiantur manu & concoctu  
faciliora, it. aromatibus ritè condita ; Quietia ac Somno indulgeatur  
moderata ; cura detur sedulò, quod excernenda excernantur & reti-  
nenda retineantur ; tandem evitetur tristitia, & lætitia potius exultet  
animus.

## §. 14.

J685  
P327d

Atque hæc de Cura Oedematis perfecti & per resolutionem  
terminantis impræsentiarum annotasse satis est, quomodo enim cede-  
mati, si durum evadat, emollientibus, quæ intergummata prima-  
tum ducunt, succurri debeat, item quomodo cœdema, ubi in imper-  
fectum degenerarit, v. g. phlemonodes &c, sit tractandum,  
sicco hac vice præterite lubet pede properan-  
ti ad

FINE M.

